

Tabelle1

<b>Name der Art</b>	<b>Stückzahl</b>	<b>Vorkommen</b>	<b>Grösse</b>	<b>Futter</b>	<b>Wasser</b>	<b>Verhalten</b>
<b>Schwarzer Phantomsalmmler</b>	<b>6</b>	<b>Südamerika, Kommt in Teilen Zentralbrasiliens und in Bolivien vor.</b>	<b>5 cm</b>	<b>Flocken-, Gefrier- und feines Lebendfutter.</b>	<b>Temperatur 23-28°C;weich (5-10°dh) Und sauer (ph6,5).</b>	<b>Friedlicher Schwarmfisch.</b>
<b>Platy,Spiegelkärpfling</b>	<b>3+3</b>	<b>Mittelamerika; Kommt vom mexikanischen Bundesstaat Veracruz bis nach Belize und Guatemala vor.</b>	<b>7,5 cm</b>	<b>Flocken- und feines Lebendfutter.</b>	<b>Temperatur 18-25°C;mittelhart (10-15°dh) und neutral bis leicht alkalisch (ph 7,0-7, 5).</b>	<b>Friedlich und gesellig.</b>
<b>Siamesischer Kampffisch</b>	<b>1</b>	<b>Südostasien;kommt in Thailand vor.Die genaue Verbreitung ist unbekannt.</b>	<b>6 cm</b>	<b>Flocken-,Frost- und Lebendfutter.</b>	<b>Temperatur 24-28°C;weich (5-10°dh) und sauer (ph 6,0-6, 5).</b>	<b>Männchen sind untereinander unverträglich.</b>
<b>Harnischwels (L104)</b>	<b>2</b>	<b>Südamerika, in großen Teilen des Amazonasgebietes weit verbreitet .</b>	<b>18 cm</b>	<b>Hauptsächlich Pflanzennahrung.</b>	<b>Temperatur 23-28°C;weich (5-10°dh) und sauer (ph 6,0).</b>	<b>Ausgewachsene Tiere verteidigen ein Revier.</b>
<b>Pracht-Panzerwels</b>	<b>3</b>	<b>Südamerika,kommt im Rio Tocantins und Rio Araguaia in Zentralbrasilien vor.</b>	<b>7,5 cm</b>	<b>Lebend-und Trockenfutter.</b>	<b>Temperatur 24-28°C;weich bis mittelhart (5-15°dh) und sauer (ph 6,0-6, 5).</b>	<b>Friedlich , geselliger Bodenbewohner.</b>
<b>Roter Neon</b>	<b>10</b>	<b>Kommt in Nebenflüssen des Rio Negro und Orinoco im Nordwesten Südamerikas vor.</b>	<b>Bis 4,5 cm.</b>	<b>Flocken-,Frost- und feines Lebendfutter.</b>	<b>Temperatur 23-26°C;weich (5-10°dh) und sauer (ph 7,0-7, 5).</b>	<b>Friedlich ;möglichst im Schwarm halten.</b>